



CENTRUM GASTROLOGICZNO HEPATOLOGICZNE

Wrocław ul. Krynicka 37/39
tel. 71 725-84-98, 71 758-44-72, 606-806-766
rejestracja@centrumgh.pl
www.centrumgh.pl

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII PREPARATEM

CitraFleet

Opakowanie zawiera 2 saszetki preparatu do rozpuszczenia w wodzie. Roztwór wypijamy w 2 porcjach

Pierwsza dawka:

Wsypać zawartość 1 saszetki do filiżanki zimnej wody (około 150 ml). Mieszać przez 2 – 3 minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się podczas mieszania, należy odczekać przed wypiciem całego roztworu do momentu ochłodzenia. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu.

W celu zapewnienia właściwego nawodnienia należy wypić jeszcze 2 l dozwolonych płynów (po około 250 ml na godzinę). Pierwszą porcję klarownego płynu należy wypić jak najszybciej po przyjęciu preparatu.

Po 6 do 8 godzinach należy przyjąć drugą dawkę preparatu.

Druga dawka:

Wsypać zawartość 1 saszetki do filiżanki zimnej wody (około 150 ml). Mieszać przez 2 – 3 minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się podczas mieszania, należy odczekać przed wypiciem całego roztworu do momentu ochłodzenia. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu.

W celu zapewnienia właściwego nawodnienia należy wypić kolejne 2 l dozwolonych płynów (po 250 ml na godzinę).