



CENTRUM GASTROLOGICZNO HEPATOLOGICZNE

Wrocław ul. Krynicka 37/39
tel. 71 725-84-98, 71 758-44-72, 606-806-766
rejestracja@centrumgh.pl
www.centrumgh.pl

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII PREPARATEM

EZICLEN

Opakowanie zawiera 2 butelki preparatu oraz miarkę. Roztwór wypijamy w dwóch dawkach.

Pierwsza dawka:

Wlać zawartość butelki do miarki uzupełnić wodą do kreski i wypić roztwór w ciągu 30-60 minut.

W celu zapewnienia właściwego nawodnienia należy wypić jeszcze 2 miarki wody w ciągu następnych 60 minut.

Druga dawka:

Wlać zawartość butelki do miarki uzupełnić wodą do kreski i wypić roztwór w ciągu 30-60 minut.

W celu zapewnienia właściwego nawodnienia należy wypić jeszcze 2 miarki wody w ciągu następnych 60 minut.

Jeżeli badanie jest w godzinach popołudniowych, pierwszą dawkę przyjmujemy w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym badanie a drugą rano w dniu badania.

Jeżeli badanie jest w godzinach dopołudniowych obie dawki przyjmujemy w godzinach popołudniowych w dniu poprzedzającym badanie.